

## 臺南市政府教育局 函

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號  
承辦人：劉峪倫  
電話：(06)2991111#1142  
電子信箱：yulun1218@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市立善化國民中學

發文日期：中華民國113年6月13日

發文字號：南市教安(二)字第1130838511號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (0838511A00\_ATTCH1.PDF、0838511A00\_ATTCH2.PDF、  
0838511A00\_ATTCH3.pdf、0838511A00\_ATTCH4.pdf)

主旨：轉知衛生福利部疾病管制署為因應年輕族群之梅毒、淋病  
感染人數增加，提供相關流行病學資料（如附件）一案，  
請各校加強校園性教育及性病防治宣導，請查照。

說明：

一、依據教育部及學前教育署113年6月11日臺教國署學字第  
1130067674號函辦理。

二、依疾管署傳染病通報系統資料顯示，近年國內梅毒、淋病  
等性傳染病疫情呈現上升趨勢，尤以年輕族群疫情上升明  
顯，疫情摘述說明如下（詳細分析資料如附件1、2）：

（一）梅毒疫情自110年起緩升，107-112年65歲以下確定病例  
數，分別為7,777、7,301、6,989、7,656、8,014、  
8,277例，112年相較於111年增加3%。其中有關13-24歲  
年輕族群疫情部分，112年梅毒及活性梅毒病例數分別為  
1,490、297例，均占整體確定病例18%，且相較於111年  
梅毒病例數增幅達20%；梅毒及活性梅毒確定病例數男性  
多於女性，112年相較於111年男、女性梅毒確定病例數

分別增加8%及98%，活性梅毒女性增加86.7%，女性增幅較男性明顯。此外，18歲以下青少年感染病例數增幅較明顯，亦值得注意。

(二)淋病疫情亦呈上升趨勢，107-112年65歲以下確定病例數，分別為4,167、4,469、7,024、7,331、7,959、8,204例，112年相較於111年疫情增加3%。其中有關13-24歲年輕族群疫情部分，112年確定病例數2,824例，約占整體病例數的34%，相較於111年增加8%；病例數男性多於女性，112年相較111年男、女性確定病例數分別增加5%及29%，女性增幅較男性明顯。此外，18歲以下青少年確定病例數增加更為明顯，值得注意。

三、感染梅毒可能出現生殖器無痛性潰瘍及硬性下疳、全身性紅疹及扁平濕疣，並出現頭痛、倦怠、發燒、體重減輕、肌肉骨骼與關節疼痛等全身性症狀，若仍未接受適當治療，通常於感染後3至7年，梅毒螺旋菌可能侵犯神經、腦部，造成「神經性梅毒」或「心臟血管性梅毒」等不可逆的損傷，且梅毒亦可透過胎盤傳染給胎兒，造成新生兒感染先天性梅毒，嚴重甚至會導致死產或死亡等不良結果。另，由於女性感染淋病後臨床症狀並不明顯，常被忽略而未積極治療，除增加傳染給性伴侶之機會，亦可能因重複感染而引起子宮或骨盆腔發炎等，增加日後子宮外孕或不孕風險，亦有可能造成新生兒感染淋菌性結膜炎。男性感染淋病未接受適當治療，亦可能產生尿道化膿、前列腺發炎，嚴重導致不孕等後遺症。防疫宣導應著重於早期診斷、早期治療。

四、為提升年輕族群性傳染病防治知能，以保護自身健康，請各校加強校園性病防治衛教宣導；包括性傳染病介紹、正確使用保險套、安全性行為、避免多重性伴侶及避免使用成癮性藥物等議題，以強化年輕族群性病防治及自我保護知能。

五、疾管署與台灣家庭醫學會、台灣泌尿科醫學會及台灣婦產科醫學會等，已合作編製有關性病防治之衛教素材，提供學校於宣導時參考運用。相關衛教素材或指引可逕至該署全球資訊網首頁(<https://www.cdc.gov.tw>)/傳染病與防疫專題/傳染病介紹/第三類法定傳染病/梅毒、淋病/治療照護/性健康友善門診項下下載運用。或可至/傳染病與防疫專題/傳染病介紹/第三類法定傳染病/人類免疫缺乏病毒(愛滋病毒)感染/宣導素材/愛滋病防治教材/年輕族群愛滋防治核心教材項下下載。

正本：臺南市政府所屬各國民中學、臺南市政府所屬各私立國民中學、臺南市政府所屬各國民小學、臺南市政府所屬各私立國民小學

副本：本局學輔校安科

